

# Grippostad<sup>®</sup> Complex

Die schnelle Lösung bei Erkältung!

- wirkt schnell
- bei Schnupfen mit erkältungsbedingten Schmerzen und Fieber
- Trinkgranulat in praktischen Portionsbeuteln zur einfachen Anwendung



STADA

„Ich muss  
schnell wieder fit  
werden und habe keine  
Vorerkrankungen.“  
Alex, 35 Jahre



**Symptome**  
Erkältung  
mit Schnupfen,  
Druckkopfschmerzen  
und Fieber



**Auch für Veganer und  
Vegetarier geeignet**



Das praktische **Grippostad® Complex Trinkgranulat** kann ganz einfach in kaltem Wasser aufgelöst werden. Als Einzeldosis können 1 oder 2 Portionsbeutel eingenommen werden. Danach kann je nach Bedarf alle 4 bis 8 Stunden eine weitere Einzeldosis eingenommen werden. Pro Tag dürfen nicht mehr als 6 Beutel eingenommen werden.

**Grippostad® Complex – die schnelle Lösung bei Erkältung**



Unser Auftrag – Ihre Gesundheit

**Grippostad® Complex ASS/Pseudoephedrinhydrochlorid 500 mg/30 mg. Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen. Wirkstoffe: Acetylsalicylsäure, Pseudoephedrinhydrochlorid. Zus.: 1 Beutel enth. 500 mg Acetylsalicylsäure u. 30 mg Pseudoephedrinhydrochlorid. Sonst. Bestandt.:** Citronensäure, Sacrose, Hypromellose, Grapefruit-Aroma. **Anw.:** Sympt. Behandl. d. Nasenschleimh.schwell. b. Schnupfen m. erkältungsbed. Schmerzen u. Fieber, Anw. d. fixen Komb. nur, wenn Nasenschleimh.schwell. gemeinsam m. Schmerzen u./od. Fieber auftr. **Gegenanz.:** Überempfg. d. Wirkst., and. Salicylate od. e. d. sonst. Bestandt.; durch Salicylate od. NSAR verur. Asthma od. Magen- u. Zwölffingerdarmgeschw. in d. Anamn.; Magen- od. Zwölffingerdarmgeschw., aktive Blutung, hämorrhag. Diathese, Thrombozytopenie, Schwangersch., Stillz., schweres Leber- od. Nierenversag., schwere Herzinsuff., Komb. m. Methotrexat (15 mg/Woche od. mehr), schwere Hypertonie, schwere KHK, Komb. Anw. m. MAO-Inhib., Kör. u. Jugendl. < 16 J. Schwangersch./Stillz.: kontraind. **NW:** Erhöht. Blutungsrisiko (z. B. perioper. Hämorrhagie, Hämatome, Nasenblut., Blut. i. Urogenitaltr. u. Zahnfl.blut.), Hämolyse u. hämolyt. Anämie b. Pat. m. schwerer Form d. G6PD-Mangels, Hämorrhagie (evtl. m. akut. u. chron. posthämorrhag. Anämie/Eisenmangelanämie m. entspr. Laborparam. u. klin. Sympt. wie Asthenie, Blässe, Hypoperfus.); Überempfindl.keitsreakt. m. entspr. Auswirk. auf Labor u. Klinik inkl. Asthma, leichte bis mäßige Reakt. evtl. d. Haut, d. Respirationstr., d. GI-Trakts u. d. kardiovask. Syst., inkl. Exanthem, Urtikaria, Ödem, Pruritus, Rhinitis, Nasenverstopf., kardio-respirator. Luftnot; schwerw. Überempfindl.keitsreakt. inkl. anaphylakt. Schock; Schwind, Tinnit., gastroduod. Beschw. (Gastralgie, Dyspepsie, Gastritis), Übelk., Erbr., Diarr.; GI-Blut. (Hämatemesis, Melaena, erosive Gastritis), i. Einzelf. m. Eisenmangelanämie; GI-Geschwüre, i. Einzelf. m. Perfor.; vorüberg. Einschr. d. Leberfkt., Erhöht. d. Transamin.; Einschr. d. Nierenfkt., akutes Nierenversagen, Stimulat. d. ZNS (z. B. Schlaflosigkeit), Halluzinat., kardiale Wirk. (z. B. Tachykardie, Palpitat., Arrhythmie), Koronarospasm. (ggf. m. Myokardinfarkt), Flush, Blutdruckanst. (nicht b. kontroll. Hypertonie), schwere Hautreakt. inkl. akute, general. exanthem. Pustulose (AGEP), Hämreten. (v. a. b. Prostatahyperpl.). **Warnhinw.:** Cave, mögl. pos. Dopingkontrollergeb.; b. Anw. als Dopingmittel schwerwieg. Gesundheitsgefährd. nicht auszuschl.! Beeintr. d. Reakt.svern. mögl.! Enthält Sacrose. Angaben gekürzt – Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Stand: Januar 2019. **STADA GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel**