

Canesten®

EXTRA

PTA IN LOVE



KEINER WILL'S MIT NAGEL PILZ

Jetzt effektiv behandeln
mit der 2-Phasen-Kurztherapie¹
von Canesten® EXTRA.

Die gründliche 2+4 Wochen Kurztherapie¹ bei
Nagelpilz mit dem Canesten® EXTRA Nagelset
und der Canesten® EXTRA Creme



Sichtbarer
Fortschritt
schon nach
1-2 Wochen!¹

¹Der infizierte Nagelteil wird abgetragen. Danach muss der entfernte Nagelteil wieder vollständig nachwachsen.

Jetzt Beratungswissen zur Fuß- und Nagelpilzbehandlung mit Canesten® EXTRA vertiefen!

Vertiefe Dein Fachwissen auf  apothekia®

1. Logge Dich auf apothekia® ein:
<https://mein.apothekia.de/campaigns?campaign=CANEXTRA>
2. Schalte mit dem Aktionscode **CANEXTRA** das Canesten® EXTRA-Gewinnspiel frei
3. Absolviere erfolgreich eine der beiden Canesten® EXTRA Schulungen

5X flip*flop
15X mymuesli
+ Prämienpunkte



Canesten® EXTRA Nagelset. Wirkstoffe: Bifonazol / Harnstoff. **Zusammensetzung:** 1 g Salbe enthält 10 mg Bifonazol und 400 mg Harnstoff. **Sonstige Bestandteile:** Wollwachs, gebleichtes Wachs, weißes Vaseline. **Anwendungsgebiete:** Zur nagelablösenden Behandlung bei Pilzinfektionen der Nägel an Händen und Füßen mit gleichzeitiger antimykotischer Wirkung. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Folgende Nebenwirkungen wurden im **Nagelbereich** (Nagel, Nagelrand, Nagelbett) nach Anwendung von Canesten EXTRA Nagelset beobachtet: Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes: Hautirritation, Kontaktdermatitis, Mazeration, Hautabschuppung, Nagelfehlbildungen, Nagelverfärbungen, Erythem, Pruritus, Exanthem, Schmerzen am Verabreichungsort, Schmerzen in den Extremitäten. Diese Nebenwirkungen sind nach Beendigung der Behandlung reversibel. **Warnhinweis:** Enthält Wollwachs! **Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen, Deutschland. Stand: 06/2015.**

Canesten® EXTRA Creme. Wirkstoff: Bifonazol. **Zusammensetzung:** 1 g Creme enthält 10 mg Bifonazol. **Sonstige Bestandteile:** Benzylalkohol, Cetylpalmitat (Ph. Eur.), Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), Octyldodecanol (Ph. Eur.), Polysorbat 60, Sorbitanstearat, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Mykosen der Haut, verursacht durch Dermatophyten, Hefen, Schimmelpilze und andere Pilze wie Malassezia furfur. Dies können sein z. B. Tinea pedis und Tinea manuum sowie die Behandlung eines freigelegten Nagelbettes im Rahmen einer Nagelpilztherapie, Tinea corporis, Tinea inguinalis, Pityriasis versicolor, oberflächliche Candidiasis sowie Erythrasma (Erkrankung durch Corynebacterium minutissimum). **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort: Schmerzen am Verabreichungsort, periphere Ödeme (am Verabreichungsort). Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes: trockene Haut, Hautirritation, Hautaufweichung, Hautabschuppung, Rötung, Brennen, Juckreiz, Ausschlag, Ekzem, Bläschen, Nesselsucht, Kontaktdermatitis, allergische Dermatitis. Diese Nebenwirkungen sind nach Beendigung der Behandlung reversibel. Benzylalkohol kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Überempfindlichkeit gegen Cetylstearylalkohol können allergische Reaktionen an der Haut auftreten. **Warnhinweis:** Enthält Benzylalkohol und Cetylstearylalkohol!
Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen, Deutschland. Stand: 09/2020.